



Versatilità degli accessi brachiali nel breve, medio e lungo termine



Stefano Elli T.I. Generale - Picc Team ASST- Monza

Terapia Intensiva Generale – A.S.S.T.-Monza - San Gerardo Dipartimento di Emergenza e Urgenza

Università degli Studi Milano-Bicocca – Direttore Prof. Giuseppe Foti www.mastermonza.it









Per ogni problema, la giusta soluzione

...e tutte passano dal braccio...



Accesso venoso brachiale: le frecce al nostro arco:

- Periferico Lungo (MiniMidline)
 Midline
- · Picc



Principi guida


- · Conservazione del patrimonio venoso (risparmiare le vene migliori per quando verranno tempi peggiori)
- Ottimizzazione di tempo e risorse (contenere i costi e aumentare l'efficienza)
- Aderenza alle indicazioni di letteratura (il fattore «farmaco» e il fattore «tempo»)

Supplement

The Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters (MAGIC): Results From a Multispecialty Panel Using the RAND/UCLA Appropriateness Method








Annals of Internal Medicine

Supplement

The Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters (MAGIC): Results From a Multispecialty Panel Using the RAND/UCLA Appropriateness Method



Vineet Chopra, MD, MSc; Scott A. Flanders, MD; Sanjay Saint, MD, MPH; Scott C. Woller, MD; Naomi P. O'Grady, MD; Nasia Safdar, MD, PhD; Scott O. Trerotola, MD; Rajiv Saran, MD, PhD; Nancy Moureau, BSN, RN; Stephen Wiseman, PharmD; Mauro Pittiruti, MD; Elie A. Aki, MD, MPH, PhD; Agnes Y. Lee, MD, MSc; Anthony Courey, MD; Lakshmi Swaminathan, MD; Jack LeDonne, MD; Carol Becker, MHSA; Sarah L. Krein, PhD, RN; and Steven J. Bernstein, MD, MPH




Annals of Internal Medicine

Supplement

The Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters (MAGIC): Results From a Multispecialty Panel Using the RAND/UCLA Appropriateness Method

Vineet Chopra, MD, MSc; Scott A. Flanders, MD; Sanjay Saint, MD, MPH; Scott C. Woller, MD; Naomi P. O'Grady, MD;
Nasia Safdar, MD, PhD; Scott O. Trerotola, MD; Rajiv Saran, MD, PhD; Nancy Moureau, BSN, RN; Stephen Wiseman, PharmD;
Mauro Pittiruti, MD; Elie A. Aki, MD, MPH, PhD; Agnes Y. Lee, MD, MSc; Anthony Courey, MD; Lakshmi Swaminathan, MD;
Jack LeDonne, MD; Carol Becker, MHSA; Sarah L. Krein, PhD, RN; and Steven J. Bernstein, MD, MPH







Utilizzo dei Mini Midline L'esperienza dell'ASST Monza



La terminologia

MiniMidline

Periferico Lungo



Le vene Target

Midline: vene profonde del braccio (basilica, brachiali)

Periferico Lungo: vene superficiali di braccio e avambraccio o vena cefalica

Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections



Naomi P. O'Grady, Mary Alexander, Lillian A. Burns, E. Patchen Dellinger, Jeffrey Garland, Stephen O. Heard, Pamela A. Lipsett, Henry Masur, Leonard A. Mermel, Michele L. Pearson, Issam I. Raad, Adrienne G. Randolph, Mark E. Rupp, Sanjay Saint, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) (Appendix 1) Bethesda, Maryland; Norwood, Worcester, Boston, Massachusetts; Staten Island, New York, Seattle, Washington; Milwaukee, Wisconsin; Baltimore, Maryland; Rhode Island; Atlanta, Georgia; Houston, Texas, Omaha, Nebraska; and Ann Arbor, Michigan

Maximal sterile barrier precautions

 Use maximal sterile barrier precautions, including the use of a cap, mask, sterile gown, sterile gloves, and a sterile full body drape, for the insertion of CVCs, PICCs, or guidewire exchange. 14,75,76,80 Category IB

Picc/Midline (vene profonde): massime precauzioni sterili di barriera

Periferico lungo (vene superficiali): precauzioni sterili ridotte



Precauzioni sterili ridotte:

- · Cuffia e mascherina non sterili
- · Telo sterile fenestrato
- · Guanti sterili
- · Guaina sterile per ecografo
- · Disinfezione con CHG2%/IPA

Un solo operatore, tempi ridotti, maggior efficienza

Il nostro paziente tipo per Periferico Lungo e Midline:



- · Terapie compatibili con vena periferica
- · Durata stimata fino a 10/15 giorni

Patrimonio venoso superficiale conservato Ridotta necessità di prelievi Patrimonio venoso superficiale esaurito Frequente necessità di prelievi



Periferico Lungo



Midline




Periferico Lungo, Midline, Picc

Gli strumenti per un'evoluzione culturale



Sfrutto fino all'estremo le vene periferiche e alla fine chiamo per un CVC o un Picc (ma non mi serviva un accesso centrale)





Valuto precocemente il paziente e posiziono il catetere proporzionato alle necessità.

Comfort, risparmio economico, risparmio di tempo...
...e la prossima volta avremo ancora qualche vena...









Repertorio iconografico GaVeCeLT



Almeno la metà potevano essere Mini Midline...
...se solo non avessimo esaurito tutte le vene con
presidi inappropriati...



Mini Midline Uno strumento semplice che fa cose semplici

Il più delle volte è

"semplicemente"

ciò che realmente serve ai miei pazienti





Stefano Elli T.I. Generale - Picc Team ASST- Monza

Terapia Intensiva Generale – A.S.S.T.-Monza - San Gerardo Dipartimento di Emergenza e Urgenza

Università degli Studi Milano-Bicocca – Direttore Prof. Giuseppe Foti www.mastermonza.it





