


L'ANTISEPSI CONTINUA DELL'EXIT SITE

CDC, SHEA e GAVeCeLT raccomandano l'utilizzo di feltrini a rilascio prolungato di clorexidina per la disinfezione continua del sito di inserzione degli accessi vascolari a breve termine:

Studi multicentrici randomizzati, che coinvolgono nel complesso più di 4.500 pazienti, dimostrano che l'utilizzo sistematico di feltrini a rilascio prolungato di clorexidina riduce fino al 60% il tasso di CRBSI.



Linee guida per la Prevenzione delle Infezioni da Cateteri Intravascolari, 2011⁽¹⁾



Medicazione del Sito di Emergenza del Catetere

12. Usare un feltrino a lento rilascio di clorexidina per i siti di emergenza dei cateteri a breve-termine – limitatamente ad adulti e bambini > 2 mesi – se il tasso di CLABSI non si abbassa nonostante l'aderenza alle misure standard di prevenzione, quali la formazione, l'addestramento, l'uso di clorexidina per l'antisepsi cutanea e l'adozione di MSB. Categoria 1B
13. Non è possibile formulare raccomandazioni sulla opportunità di utilizzare altri tipi di medicazioni a lento rilascio di clorexidina. Problema irrisolto.

Strategie per la prevenzione delle infezioni del torrente circolatorio associate agli accessi venosi centrali (CLABSI) nei reparti di terapia intensiva⁽²⁾

Infection Control and Hospital Epidemiology Ottobre 2008



Approcci speciali per la prevenzione delle CLABSI:

3. Usare feltrini a rilascio di clorexidina per la medicazione del sito di inserzione dei CVC nei pazienti di età superiore ai 2 mesi (B-I).

L'aggiunta di tale dispositivo ai protocolli di medicazione va considerato nei seguenti casi:

- i. Le unità ospedaliere o le popolazioni di pazienti monitorate hanno un tasso di CLABSI superiore all'obiettivo istituzionale, nonostante l'osservanza di un bundle di prevenzione basato sull'evidenza clinica.
- ii. I pazienti trattati presentano un accesso venoso limitato ed una storia di ricorrenti CLABSI.
- iii. I pazienti sono da considerarsi ad alto rischio di CLABSI (per es. pazienti con recenti impianti di protesi intravascolari, quali valvole cardiache o graft aortici).

- b. Non usare feltrini a rilascio di clorexidina per neonati prematuri con basso peso corporeo.

Inserisci BioPatch nella strategia di riduzione delle CRBSI del tuo reparto

Principali consigli delle linee guida di riferimento

- Igiene delle mani e massime precauzioni di barriera
- Scelta appropriata del sito di inserzione
- Impianto ecoguidato, ovunque possibile, sia per i cateteri a inserzione centrale che per i cateteri a inserzione periferica.
- Utilizzo di clorexidina al 2% per l'antisepsi cutanea
- Impiego di sutureless devices per il fissaggio del catetere, ovunque possibile.
- Impiego di medicazioni semipermeabili trasparenti, ovunque possibile.
- Rimozione immediata del catetere venoso non più indispensabile



BioPatch



Riduzione del tasso di CRBSI

Miglior OUTCOME del paziente

Riduzione dei costi ospedalieri

- BioPatch è l'unica medicazione a rilascio prolungato di CHG con efficacia clinicamente provata
- BioPatch ha un'efficacia antibatterica ad ampio spettro che protegge dai patogeni maggiormente associati alle CRBSI
- BioPatch associa capacità assorbenti ad una tecnologia di rilascio continuo di CHG che lo rende efficace per 7 giorni

Reference

- 1 Naomi P. O'Grady, Mary Alexander, et al "Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011"
- 2 Jonas Marschall, et al. "Strategies to Prevent Central Line-Associated Bloodstream Infections in Acute Care Hospitals", 2008



Per ordini e consegne:

SERVIZIO CLIENTI

Via del Mare, 56
00040 Pratica di Mare - Pomezia (RM)
Tel. 0691194599 - Fax 06/91194505
e-mail: cservice@ethit.jnj.com

Per notizie sui prodotti:

DIPARTIMENTO MARKETING

Tel. 06/91194276
Fax 06/91194997
e-mail: emostatici@its.jnj.com
web-site: www.jnjmedical.it

Codice Prodotto	3150	3151	3152
Misura	Foro di 4mm	Foro di 1,5mm	Foro di 7mm
Misura in Fr	6-12 Fr	<6 Fr	13-20 Fr
Contenuto medio di CHG per medicazione	92 mg	52.5 mg	86.8 mg
Differenti applicazioni	Picc, CVC, Hickman, Cateteri per emodialisi, Fissatori esterni, drenaggi	Picc, CVC, Cateteri epidurali, linee arteriose, PORT	Cateteri per emodialisi, Fissatori esterni, drenaggi