

Posizionamento ecoguidato di PICC a punta aperta

M.Pittiruti, G.Scoppettuolo, C.Taraschi, L.Dolcetti
Università Cattolica
Roma


Necessità di accesso venoso in paziente con neoplasia avanzata del rinofaringe



Si decide posizionamento ecoguidato di PICC a punta aperta per chemioterapia



Studio ecografico delle vene del braccio, senza e con laccio emostatico




Controllo ecografico della pervietà della vena ascellare e della vena anonima omolaterale



Stima della lunghezza del PICC (distanza tra sito di puntura e punto emiclavare + distanza tra punto emiclavare e III spazio intercostale sulla parasternale dex)



Collegamento con elettrodi ECG



Disinfezione con clorexidina 2%



Preparazione del materiale



Preparazione del campo




Preparazione della sonda e visualizzazione della vena



Venipuntura ecoguidata




Inserimento della guida metallica




Slargamento del tramite cutaneo




Inserzione del microintroduttore-dilatatore



Preparazione del catetere




Rimozione del dilatatore ed inserzione del catetere



Inserzione del catetere, mantenendo la giugulare interna compressa dalla sonda ecografica




Rimozione dell'introduttore



Verifica della posizione della punta: assenza del catetere in giugulare



Verifica della posizione della punta: rilevazione della onda P atriale con il metodo ECG



Aspirazione e lavaggio



Fissaggio con Statlock



Medicazione

